

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

STOZZON-L[®] tablets 300
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

PROVET A.E.

Λεωφ. Ποσειδώνος 77

174 55 Άλιμος, Αττική

Τηλ.: +30 2105575770-3

+30 2105508500

Fax: +30 2105575830

E-mail: vet@provet.gr

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
STOZZON-L[®] tablets 300

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Κάθε δισκίο περιέχει:

Δραστικό συστατικό: 300 mg Levamisole hydrochloride

Έκδοχα: Lactose, Polyvinylpyrrolidone (PVP), Microcrystalline cellulose, Sodium starch glucolate, Talc, Magnesium stearate, Colloidal silicon dioxide, Alcohol

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Το STOZZON-L[®] είναι ανθελμινθικό ευρέος φάσματος κατά των νηματωδών παρασίτων. Χρησιμοποιείται για την πρόληψη και τη θεραπεία της γαστρεντερικής και πνευμονικής στρογγυλίδωσης των προβάτων.

Ειδικότερα, η λεβαμιζόλη είναι πολύ αποτελεσματική κατά των ενήλικων (95-100%) και των άωρων (85-95%) μορφών των ειδών: *Haemonchus* spp., *Neoascaris vitulorum*, *Trichostrongylus* spp., *Chabertia ovina*, *Cooperia* spp., *Oesophagostomum* spp., *Nematodirus* spp., *Dictyocaulus* spp., *Marshallagia marshalli*, *Thelazia* spp. και *Bunostomum* spp.

Η λεβαμιζόλη είναι πολύ αποτελεσματική και κατά των ανθεκτικών στις βενζιμιδαζόλες στελεχών των *Haemonchus contortus*, *Ostertagia circumcincta* και *Trichostrongylus* spp. Ορισμένα, όμως, στελέχη των παρασίτων αυτών μπορεί να αναπτύξουν ανθεκτικότητα και κατά της λεβαμιζόλης. Η ανθεκτικότητα αυτή δε διασταυρώνεται με εκείνη των βενζιμιδαζολών.

Η λεβαμιζόλη είναι 80% αποτελεσματική κατά των ενήλικων και άωρων *Ostertagia* spp. Η λεβαμιζόλη είναι μερικώς αποτελεσματική (60-80%) κατά του *Protostrongylus rufescens* και του *Strongyloides papillosus* και πολύ λιγότερο (κάτω του 60%) κατά του *Trichuris* spp. Η λεβαμιζόλη δεν είναι αποτελεσματική κατά του *Muellerius capillaris* και του *Cystocaulus ocreatus*, καθώς και κατά των υποβιοτικών προνυμφών L₄ των *Ostertagia* spp. Επίσης, δεν έχει ωοκτόνους ιδιότητες.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Η λεβαμιζόλη πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ζώα με νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Μερικά ζώα μπορεί να γίνουν ανήσυχα, να παρουσιάσουν διέγερση και σιελόρροια μέσα σε λίγα μόνο λεπτά από τη χορήγηση του φαρμάκου.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά τον κτηνίατρό σας.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Πρόβατα (κρεοπαραγωγή)

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η γενική δοσολογία της λεβαμιζόλης στα πρόβατα κρεοπαραγωγής είναι 7,5 mg/ kg σ.β., ειδικότερα 1 δισκίο STOZZON-L® 300 tabs των 300 mg/ 40 kg σ.β.

Τα δισκία χορηγούνται με ειδικό εκτοξευτήρα ή τοποθετούνται στη βάση της γλώσσας. Δεν απαιτείται διαίτα των ζώων πριν από τη χορήγηση.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Δεν αναφέρονται.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας: 7 ημέρες

Να μη χορηγείται σε γαλακτοπαραγωγά πρόβατα, τα οποία παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε χώρο δροσερό και ξηρό προστατευμένο από το φως.

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Κατά τη χορήγηση κλωστριδιακών εμβολίων η παράλληλη χορήγηση λεβαμιζόλης βελτιώνει τον τίτλο των παραγόμενων αντισωμάτων.

Η λεβαμιζόλη δεν πρέπει για 72 τουλάχιστον ώρες (3 ημέρες) μετά τη θεραπεία να συνδυάζεται με τετραχλωριούχο άνθρακα, εξαχλωροαιθάνιο, εξαχλωροφαίνη και σουλφοξείδιο της βιθειονόλης, γιατί οι συνδυασμοί αυτοί είναι τοξικοί.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

14. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κουτί των 50 δισκίων σε blister

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 8204/25-05-2005/K-0030402

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793.777